

# Лицевая боль. Классификация



**В соответствии с терминологией Международной ассоциации изучения боли (International Association for the Study of Pain – IASP) орофациальная боль – это вид боли, которая ощущается в лице и/или полости рта.**

Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра лицевые боли подразделяются на связанные с патологией анатомических структур головы и шеи, краниальные невралгии и центральные боли; лицевая боль стоит под шифром G50.1 – атипичная лицевая боль.

## Разновидности лицевой боли

### Невралгия тройничного нерва

**Синонимы:** тригеминальная невралгия, болевой тик, болезнь Фозерджилла.

Это хроническое заболевание, проявляющееся приступами чрезвычайно интенсивной, стреляющей боли в зонах иннервации II, III или, крайне редко, I ветви тройничного нерва.

- ⊙ **Первичная (идиопатическая)** в большинстве случаев связана с компрессией корешка тройничного нерва в области его вхождения в ствол мозга, обусловленной патологически извитой петлей верхней мозжечковой артерии (80% случаев).
- ⊙ **Вторичная (симптоматическая)** – проявление других заболеваний центральной нервной системы (рассеянный склероз, глиома ствола мозга, опухоли мостомозжечковой области, стволовой инсульт и др.).

#### Невралгии отдельных ветвей тройничного нерва:

- Назоцилиарная невралгия Шарлена – колющая боль с иррадиацией в центральную область лба при прикосновении к наружной поверхности ноздри.
- Супраорбитальная невралгия – пароксизмальная или постоянная боль в зоне иннервации супраорбитального нерва.
- Невралгия (невропатия) инфраорбитального нерва (воспаление в гайморовой пазухе или поражение нерва при стоматологических манипуляциях) – незначительная боль, чувство онемения слизистой оболочки верхней челюсти и подглазничной области.
- Невралгия язычного нерва (при длительном раздражении языка протезом, острым краем зуба) – умеренные боли в полости языка.
- Невралгия (невропатия) нижнего альвеолярного нерва (при травмах и воспалении нижней челюсти, при выхождении пломбирочного материала за верхушку зуба, при одномоментном удалении нескольких зубов) – умеренная постоянная боль в зубах нижней челюсти, подбородка и нижней губы.
- Невропатия щечного нерва – гипестезия слизистой оболочки щеки и кожи соответствующего угла рта.
- «Тик-невралгия» – сочетание периодической мигренозной невралгии и невралгии I ветви тройничного нерва.

### Синдром Ханта

При герпетической инфекции – поражение III, IV и/или VI пары черепных нервов, коленчатого ганглия с нарушением функции лицевого и/или преддверно-улиткового нерва.

### Синдром Толосы–Ханта

Внезапные периодические боли в области глазницы, отек, поражение одного или нескольких черепных нервов (III, IV и/или VI).

### Невралгия языкоглоточного нерва

Болевые пароксизмы, начинающиеся в области корня языка или миндалина и распространяющиеся на небную занавеску, глотку, ухо, иногда иррадиирующие в угол нижней челюсти, глаз, шею. Кратковременные. Односторонние, провоцируются движениями языка. Во время приступа больные жалуются на сухость в горле, а после приступа появляется гиперсаливация. Количество слюны на стороне боли всегда снижено, даже в период саливации (по сравнению со здоровой стороной). Слюна на стороне боли более вязкая.

### Невралгия барабанного сплетения

Типичны острые приступообразные стреляющие боли в области наружного слухового прохода, возникают без видимых внешних причин.

### Невралгия промежуточного нерва

Короткие пароксизмы боли в глубине ушного прохода от нескольких секунд до нескольких минут преимущественно на задней стенке ушного прохода, где имеется триггерная зона. Иногда боль может сопровождаться нарушениями слезо-, слюноотделения и/или вкуса, часто обнаруживается связь с Herpes zoster.

### Скелетно-мышечные прозокраниалгии

Чаще связаны с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава и миофасциальным болевым синдромом. Боли в жевательных мышцах, усиливающиеся при движениях нижней челюсти, ограничение ее подвижности (открывание рта до 15–25 мм между резцами вместо 46–56 мм в норме), щелчки и крепитация в суставе, S-образное отклонение нижней челюсти в сторону или вперед при открывании рта, боль при пальпации мышц, поднимающих нижнюю челюсть.

### Шейно-язычный синдром

Боли в затылочной или верхнешейной области, которые возникают при резком повороте головы и сопровождаются неприятными ощущениями в половине языка (дизестезии, чувство онемения и боли).

### Синдром шиловидного отростка

Боли слабой или умеренной интенсивности в задней части полости рта, возникающие при глотании, опускании нижней челюсти, повороте головы в сторону и пальпации проекции области шилоподъязычной связки.

### Синдром шиловидного отростка

Боли слабой или умеренной интенсивности в задней части полости рта, возникающие при глотании, опускании нижней челюсти, повороте головы в сторону и пальпации проекции области шилоподъязычной связки.

### Психогенные лицевые боли

Наблюдаются в рамках депрессивного синдрома или неврозов (истерии).

- **Галлюциногенные боли** сопровождают психические заболевания (шизофрения, маниакально-депрессивный психоз).
- **Истерические лицевые боли** – симметричные, сочетаются с головными болями, их интенсивность варьирует в течение дня.
- **Лицевые боли** при депрессиях чаще двусторонние, обычно сочетаются с головными болями, часто отмечают сенсопатии, выражаемые простыми вербальными характеристиками. Сочетаются с основными симптомами депрессии (двигательная заторможенность, брадифрения, мимические маркеры депрессии, такие как опущенные углы рта, складка Верагута и др.).

Источник: Неврология. Национальное руководство. Краткое издание. Под ред. Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова, А.Б. Гехт. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.